
RED DE SEGUIMIENTO DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS

DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

INFORME FINAL DEL EMBALSE DE CASPE



ÁREA DE CALIDAD DE AGUAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO



RED DE SEGUIMIENTO DE MASAS DE AGUA MUY MODIFICADAS DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

PROMOTOR:



CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

SERVICIO:

CONTROL DEL ESTADO ECOLÓGICO

DIRECCIÓN DEL PROYECTO:

Concha Durán Lalaguna y María José Rodríguez Pérez

EMPRESA CONSULTORA:

Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia Estudi General

EQUIPO DE TRABAJO:

Área de Limnología, dirigida por Dr. Eduardo Vicente Pedrós, Catedrático de Ecología. Director del Estudio.

PRESUPUESTO DE LA ADJUDICACIÓN:

70.590,38 €

CONTENIDO:

INFORME INDIVIDUAL DEL EMBALSE DE CASPE

AÑO DE EJECUCIÓN:

2015

FECHA ENTREGA:

DICIEMBRE 2015

REFERENCIA IMÁGENES PORTADA:

Vista del acceso al embalse de Caspe.

CITA DEL DOCUMENTO: Confederación Hidrográfica del Ebro (2015). Red de seguimiento de masas de agua muy modificadas en la Demarcación Hidrográfica del Ebro. 208 págs. más anejos. Disponible en PDF en la web: <http://www.chebro.es>

El presente informe pertenece al Dominio Público en cuanto a los Derechos Patrimoniales recogidos por el Convenio de Berna. Sin embargo, se reconocen los Derechos de los Autores y de la Confederación Hidrográfica del Ebro a preservar la integridad del mismo, las alteraciones o la realización de derivados sin la preceptiva autorización administrativa con fines comerciales, o la cita de la fuente original en cuanto a la infracción por plagio o colusión. A los efectos prevenidos, las autorizaciones para uso no científico del contenido deberán solicitarse a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

ÍNDICE

	Página
1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE.....	7
2.1. <i>Ámbito geológico y geográfico</i>	<i>7</i>
2.2. <i>Características morfométricas e hidrológicas</i>	<i>8</i>
2.3. <i>Usos del agua</i>	<i>9</i>
2.4. <i>Registro de zonas protegidas.....</i>	<i>9</i>
3. TRABAJOS REALIZADOS	10
4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL	11
4.1. <i>Características fisicoquímicas de las aguas</i>	<i>11</i>
4.2. <i>Hidroquímica del embalse.....</i>	<i>14</i>
4.3. <i>Fitoplancton y concentración de clorofila</i>	<i>15</i>
4.4. <i>Zooplancton.....</i>	<i>20</i>
5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO	22
6. DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO	23
ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO	

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS

ÍNDICE DE FIGURAS CORRESPONDIENTES A GRÁFICOS Y FOTOS

Figura 1. Volumen embalsado y salida durante el año hidrológico 2014-2015.	9
Figura 2. Localización de la estación de muestreo en el embalse.	10
Figura 3. Perfil vertical de la temperatura y pH	11
Figura 4. Perfil vertical de la extinción luminosa y oxígeno disuelto	12
Figura 5. Perfil vertical de la conductividad	13
Figura 6. Perfil vertical de la clorofila a	16
Figura 7. Fotografía de la cola del embalse	29
Figura 8. Fotografía del punto de acceso al embalse.	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Características morfométricas del embalse de Caspe	8
Tabla 2. Estructura y composición de la comunidad de fitoplancton.....	15
Tabla 3. Composición detallada de la comunidad de fitoplancton.....	16
Tabla 4. Estructura y composición de la comunidad de zooplancton.....	20
Tabla 5. Composición detallada de la comunidad de zooplancton.....	21
Tabla 6. Parámetros indicadores y rangos de estado trófico.	22
Tabla 7. Diagnóstico del estado trófico del embalse de Caspe.....	22
Tabla 8. Parámetros y rangos para la determinación del potencial ecológico experimental.	23
Tabla 9. Combinación de los indicadores.....	24
Tabla 10. Diagnóstico del potencial ecológico del embalse de Caspe.....	24
Tabla 11. Valores de referencia propios del tipo (VR_t) y límites de cambio de clases de potencial ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de embalses (RD 817/2015).	25
Tabla 12. Parámetros, rangos del RCE y valores para la determinación del potencial ecológico normativo.	26
Tabla 13. Combinación de los indicadores.....	26
Tabla 14. Diagnóstico del potencial ecológico (PE_{norm}) del embalse de Caspe.	27

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge los resultados de los trabajos realizados en el embalse de Caspe durante los muestreos de 2015 y la interpretación de los mismos, a efectos de proporcionar una referencia que facilite la consulta y explotación de la información obtenida.

En general, se recurre a presentaciones gráficas y sintéticas de la información, acompañadas de un texto conciso, lo que permitirá una consulta ágil y rápida del documento.

En el **Anexo I** se presenta un reportaje fotográfico que refleja el estado del embalse durante el periodo estudiado (verano de 2015, correspondiente al año hidrológico 2014-2015).

En apartados sucesivos se comentan los siguientes aspectos:

- Resultados del estudio en el embalse (FASE DE CARACTERIZACIÓN) de todos los aspectos tratados (hidrológicos, fisicoquímicos y biológicos), que culminan en el diagnóstico del grado trófico.
- Clasificación del “Potencial Ecológico”, tras la aplicación de los indicadores biológicos y fisicoquímicos propuestos en la Directiva Marco del Agua.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EMBALSE Y DE LA CUENCA VERTIENTE

2.1. Ámbito geológico y geográfico

La cuenca vertiente del embalse de Caspe se ubica sobre las formaciones de lutitas pertenecientes al Paleógeno, así como en depósitos aluviales, gravas, limos y arcillas del Cuaternario.

El embalse de Caspe se sitúa dentro del término municipal de Caspe, en la provincia de Zaragoza. Regula las aguas del río Guadalope.

2.2. Características morfométricas e hidrológicas

Se trata de un embalse de geometría irregular y sinuosa.

La cuenca vertiente al embalse de Caspe tiene una superficie total de 366393,47 ha.

Este embalse tiene una capacidad total de 81,62 hm³, que coincide con la capacidad útil. Caracterizado por una profundidad media de 12,7 m, mientras que la profundidad máxima alcanza los 46 m.

En la tabla 1 se presentan las características morfométricas del embalse.

Tabla 1. Características morfométricas del embalse de Caspe.

Superficie de la cuenca	3664 km ²
Capacidad total N.M.N.	81,62 hm ³
Capacidad útil	81,62 hm ³
Aportación media anual	94 hm ³
Superficie inundada	638 ha
Cota máximo embalse normal	230 msnm

Tipo de clasificación: 12. Monomítico, calcáreo de zonas no húmedas, pertenecientes a tramos bajos de ejes principales.

Se trata de un embalse monomítico, de geología calcárea y ubicado en tramos bajos de los ejes principales. En el momento del muestreo la termoclina se sitúa entre los 7 y los 12 metros de profundidad. El límite inferior de la capa fótica se encuentra alrededor de los 11 metros de profundidad determinado mediante medidor fotoeléctrico, aunque la estimación mediante el disco de Secchi era de 12,5 m.

El tiempo de residencia hidráulica media en el embalse de Caspe para el año hidrológico 2014-2015 fue de 3,16 meses.

En la figura 1 se presentan los valores diarios del volumen embalsado y salida media correspondientes al año hidrológico 2014-2015. Se observa una crecida muy importante a finales de marzo.




Figura 1. Volumen embalsado y salida durante el año hidrológico 2014-2015.

2.3. Usos del agua

Las aguas del embalse se destinan principalmente al abastecimiento humano y a los regadíos. Con respecto al uso recreativo, destacar la pesca y la navegación (existe un club náutico en las orillas del embalse).

2.4. Registro de zonas protegidas

El embalse de Caspe forma parte del Registro de Zonas Protegidas elaborado por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en contestación al artículo 6 de la Directiva Marco del Agua, en las categorías de: zonas de extracción de agua para consumo humano y zonas sensibles a nutrientes (zonas sensibles bajo el marco de la directiva 91/271/CEE).

3. TRABAJOS REALIZADOS

Para acometer la caracterización del embalse se ha ubicado una estación de muestreo en las inmediaciones de la presa (ver figura 2). Se ha completado una campaña de muestreo el 5 de agosto de 2015, en la que se midieron *in situ* los parámetros fisicoquímicos y la transparencia en la columna de agua, se tomó una muestra de agua integrada y otras puntuales para los análisis químicos y se realizaron muestreos de fitoplancton y zooplancton.





Figura 2. Localización de la estación de muestreo en el embalse.


4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

4.1. Características fisicoquímicas de las aguas

De los resultados obtenidos se desprenden las siguientes apreciaciones:




La temperatura del agua oscila entre los 13,35 °C – en el fondo- y los 27,07 °C - máximo registrado en superficie-. En el momento del muestreo (agosto 2015) la termoclina se sitúa entre los 7 y los 12 metros de profundidad.




El pH del agua en la superficie es de 8,44, máximo epilimnético. En el fondo del embalse el valor del pH es de 8,00. El valor mínimo estival se sitúa a 8,7 m con un pH de 7,73.

Figura 3. Perfil vertical de la temperatura y pH.




La transparencia del agua registrada en la lectura de disco de Secchi es de 5,0 m, lo que supone una profundidad de la capa fótica en torno a 12,5 metros. Sin embargo, la capa fótica determinada con medidor fotoeléctrico es de 11 m, por lo que a efectos de muestreo se considera ese espesor de columna de agua.

La turbidez media de la zona eufótica (muestra integrada a 11 m de profundidad) fue de 2,31 UAF.



Las condiciones de oxigenación de la columna de agua alcanzan en la zona fótica una concentración media de 2,13 mg/L. Se han detectado condiciones anóxicas ($<2 \text{ mg O}_2/\text{L}$) en profundidades superiores a 8 m, creando una fuerte oxiclina entre los 7 y los 9 metros de profundidad.

Figura 4. Perfil vertical de la extinción luminosa y oxígeno disuelto.



La conductividad del agua es de 750 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en la superficie y de 784 $\mu\text{S}/\text{cm}$ en el fondo. Se ha encontrado el máximo de conductividad a 8,5 metros de profundidad con un valor de 881 $\mu\text{S}/\text{cm}$.

Figura 5. Perfil vertical de la conductividad.

4.2. Hidroquímica del embalse

De los resultados analíticos obtenidos en la campaña de 2015 en la muestra integrada, se desprenden las siguientes apreciaciones:

- La concentración de fósforo total (PT) en la muestra integrada (zona fótica) fue de 9,25 $\mu\text{g P/L}$.
- La concentración de P soluble fue de 0,32 $\mu\text{g P/L}$.
- La concentración de nitrógeno total (NT) fue de 1,02 mg N/L.
- La concentración de nitrógeno inorgánico oxidado (nitrato + nitrito, NIO) tomó un valor de 0,94 mg N/L.
- La concentración de amonio (NH_4) resultó ser de 0,060 mg N/L.
- La concentración de sílice tomó un valor de 1,90 mg SiO_2/L .
- La alcalinidad en este embalse (zona fótica) fue de 2,95 meq/L.

4.3. Fitoplancton y concentración de clorofila

En el análisis de fitoplancton se han identificado un total de 45 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

BACILLARIOPHYCEAE	4
CHRYSTOPHYCEAE	3
SYNUROPHYCEAE	1
XANTHOPHYCEAE	1
CHLOROPHYCEAE	19
ZYGNEMATOPHYCEAE	2
CYANOBACTERIA	5
CRYPTOPHYCEAE	6
DINOPHYCEAE	2
EUGLENOPHYCEAE	2

La estructura de la comunidad de fitoplancton se resume en la tabla 2 y la composición detallada en la tabla 3.

Tabla 2. Estructura y composición de la comunidad de fitoplancton.

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
Nº CÉLULAS TOTALES	nº cél./ml	10015
BIOVOLUMEN TOTAL	µm³/ml	974265
Diversidad Shannon-Wiener		2,72
CLASE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		Cyanobacteria
Nº células/ml		8099
ESPECIE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		<i>Aphanocapsa</i> sp.
Nº células/ml		4566
CLASE PREDOMINANTE (BIOVOLUMEN)		Cryptophyceae
µm³/ml		520350
ESPECIE PREDOMINANTE (BIOVOLUMEN)		<i>Cryptomonas erosa</i>
µm³/ml		496786

La concentración de clorofila fue de 3,31 $\mu\text{g/L}$ para la muestra integrada, cuya profundidad se ha señalado en la figura 6 con una línea roja. El perfil vertical determinado mediante fluorimetría ha mostrado un máximo metalimnético a los 10 metros de profundidad.




Figura 6. Perfil vertical de la clorofila *a*.

La composición de la población fitoplanctónica de la muestra integrada de la zona fótica indicando su abundancia y biovolumen, y la densidad cualitativa de la muestra integrada de fitoplancton del muestreo vertical con red de plancton, muestran los resultados de la tabla 3:

Tabla 3. Composición detallada de la comunidad de fitoplancton.

COD_EMB_LW	COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA	BIOVOLUMEN	CUALITATIVO
	FITOPLANCTON	cél./ml	$\mu\text{m}^3/\text{ml}$	(1 al 5)
	BACILLARIOPHYCEAE/CENTRALES/			
CYCLOCEL0	<i>Cyclotella ocellata</i> (=Lindavia ocellata)	19	4.749	1
	BACILLARIOPHYCEAE /PENNALES/			
ACHNMINU0	<i>Achnantheidium minutissimum</i> (=Achnanthes minutissima)	3	79	
GYROACUM0	<i>Gyrosigma acuminatum</i>			1
NAVICUSP0	<i>Navicula cuspidata</i> (=Craticula cuspidata)			1
NITZACIC0	<i>Nitzschia acicularis</i>	13	3.023	
NITZPALE0	<i>Nitzschia palea</i>	123	48.496	1
	CHRYSOPHYCEAE			
CHRYOGEN0	<i>Chrysochromulina</i> sp.	202	6.449	

COD_EMB_LW	COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA	BIOVOLUMEN	CUALITATIVO
	FITOPLANCTON	cél./ml	µm ³ /ml	(1 al 5)
DINOCRENO	<i>Dinobryon crenulatum</i>	3	808	
DINODIVE0	<i>Dinobryon divergens</i>	157	27.432	1
	SYNUROPHYCEAE			
MALLMINU0	<i>Mallomonas minuta</i>			1
MALLOVIF0	<i>Mallomonas oviformis</i> (=Mallomonopsis oviformis)	3	3.940	
	XANTHOPHYCEAE			
TRACSEXA0	<i>Trachydiscus sexangulatus</i>	54	15.893	
	CHLOROPHYTA			
SCENACUT0	<i>Acutodesmus obliquus</i> (=Scenedesmus obliquus=Scenedesmus acutus)	10	214	1
CARTEGEN0	<i>Carteria</i> sp.	6	16.201	
CLOSACIR0	<i>Closteriopsis acicularis</i>	13	4.122	
COELASTR0	<i>Coelastrum astroideum</i>			1
COELMICR0	<i>Coelastrum microporum</i>			1
COENHIND0	<i>Coenochloris hindakii</i>	353	11.819	1
COENOGEN0	<i>Coenochloris</i> sp.	50	2.533	1
CRUCTETR0	<i>Crucigenia tetrapedia</i>	13	907	
CHORCHOD0	<i>Choricystis chodatii</i>	16	519	
ELAKGELA0	<i>Elakatothrix gelatinosa</i>	19	801	
COELRETI0	<i>Hariotina reticulata</i> (=Coelastrum reticulatum)	20	1.319	1
KIRCOBES0	<i>Kirchneriella obesa</i>			1
LAGEQUAD0	<i>Lagerheimia quadriseta</i>	6	422	1
PEDISIMP0	<i>Monactinus simplex</i> (=Pediastrum simplex)			1
OOCYLACU0	<i>Oocystis lacustris</i>	25	1.477	
OOCYMARS0	<i>Oocystis marssonii</i>	28	6.411	1
PEDIBORY0	<i>Pediastrum boryanum</i>			1
PEDIDUPL0	<i>Pediastrum duplex</i>	50	12.596	1
PEDSIECH2	<i>Pediastrum simplex</i> var. <i>echinulatum</i>	50	6.298	
PEDINGEN0	<i>Pedinomonas</i> sp.	25	317	
PLANLAUT0	<i>Planctonema lauterbornii</i>	173	5.951	1
DIDYPLAN0	<i>Pseudodidymocystis planctonica</i> (=Didymocystis planctonica)	25	264	
SCENARMA0	<i>Scenedesmus armatus</i> (=Desmodesmus armatus)			1
SCENLINE0	<i>Scenedesmus ellipticus</i> (=Scenedesmus linearis)	25	2.111	
TETRKOMA0	<i>Tetrastrum komarekii</i>	76	5.442	1
	ZYGNEMATOPHYCEAE			
COSMABBR0	<i>Cosmarium abbreviatum</i>			1
COSMLAEV0	<i>Cosmarium laeve</i>	16	14.774	1
STAUPARA0	<i>Staurastrum paradoxum</i>			1
STAUPING0	<i>Staurastrum pingue</i>	3	4.761	
STAUTETR0	<i>Staurastrum tetracerum</i>			1
	CYANOBACTERIA			

COD_EMB_LW	COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA	BIOVOLUMEN	CUALITATIVO
	FITOPLANCTON	cél./ml	µm ³ /ml	(1 al 5)
ANABAGEN0	<i>Anabaena</i> sp.			1
ANABAGEN0	<i>Anabaena</i> sp.	21	2.053	
APHAGRAC0	<i>Aphanizomenon gracile</i>			1
APHASGEN0	<i>Aphanocapsa</i> sp.	4.566	2.391	1
MERIMINI0	<i>Merismopedia minima</i>	101	1.425	
MERISGEN0	<i>Merismopedia</i> sp.			1
MICRAERU0	<i>Microcystis aeruginosa</i>	1.925	27.210	5
OSCILGEN0	<i>Oscillatoria</i> sp.			1
PSEUDGEN0	<i>Pseudanabaena</i> sp.			1
WORONAEG1	<i>Woronichinia naegeliana</i>	1.486	74.712	3
	CRYPTOPHYCEAE			
CRYPERSO0	<i>Cryptomonas erosa</i>	208	496.786	
CRYPMARS0	<i>Cryptomonas marsonii</i>	16	8.970	
CRYPOVAT0	<i>Cryptomonas ovata</i>	6	8.778	
CRYPPHAS0	<i>Cryptomonas phaseolus</i>	9	1.959	
CRYPTGEN0	<i>Cryptomonas</i> sp.			1
PLAGLACU0	<i>Plagioselmis</i> (=Rhodomonas) <i>lacustris</i>	19	1.570	
PLAGNANNO	<i>Plagioselmis nannoplanctica</i> (=Rhodomonas <i>lacustris</i> var. <i>nannoplanctica</i>)	63	2.286	
	DINOPHYCEAE			
CERAHIRU0	<i>Ceratium hirundinella</i>	1	55.096	1
GYMNWAWR0	<i>Gymnodinium wawriake</i>	9	15.671	
PERIUMBO0	<i>Peridinium umbonatum</i> (=Parvodinium <i>umbonatum</i>)			1
	EUGLENOPHYCEAE			
EUGLOXYU0	<i>Euglena oxyuris</i>			1
EUGLEGEN0	<i>Euglena</i> sp.	1	929	
LEPOOVUM0	<i>Lepocinclis ovum</i>			1
PHACCAUD0	<i>Phacus caudatus</i>			1
PHACLONG0	<i>Phacus longicauda</i>	3	64.304	1

COD_EMB_LW	COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA	BIOVOLUMEN	CUALITATIVO
	FITOPLANCTON	cél./ml	µm ³ /ml	(1 al 5)
	TOTALES BACILLARIOPHYCEAE	157	56.346	
	TOTALES CHRYSOPHYCEAE	362	34.690	
	TOTALES SYNUROPHYCEAE	3	3.940	
	TOTALES XANTHOPHYCEAE	54	15.893	
	TOTALES CHLOROPHYTA	984	79.723	
	TOTALES ZYGNEMATOPHYCEAE	19	19.535	
	TOTALES CYANOBACTERIA	8.099	107.790	
	TOTALES CRYPTOPHYCEAE	321	520.350	
	TOTALES DINOPHYCEAE	11	70.766	
	TOTALES EUGLENOPHYCEAE	4	65.233	
	TOTALES ALGAS	10.015	974.265	

Nota: Entre paréntesis se cita el anterior nombre de la especie.

Clases de abundancia	% de presencia
1	<9
2	10-24
3	25-60
4	61-99
5	>99

4.4. Zooplancton

En el análisis de zooplancton de las muestras del embalse de Caspe se han identificado un total de 19 especies, distribuidas en los siguientes grupos taxonómicos:

- 3 Cladocera
- 4 Copepoda
- 11 Rotifera
- 1 Otros

La estructura y composición de la comunidad de zooplancton se resume en la tabla 4:

Tabla 4. Estructura y composición de la comunidad de zooplancton.

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR
PROFUNDIDAD	m	7,0
DENSIDAD TOTAL	individuos/L	534,62
BIOMASA TOTAL	µg/L	238,53
Diversidad Shannon-Wiener		3,13
CLASE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		Rotíferos
individuos/L		381,54
ESPECIE PREDOMINANTE (DENSIDAD)		<i>Keratella cochlearis</i>
individuos/L		183,08
CLASE PREDOMINANTE (BIOMASA)		Cladóceros
µg/L		147,94
TAXÓN PREDOMINANTE (BIOMASA)		<i>Diaphanosoma mongolianum</i>
µg/L		138,46
COLUMNA AGUA INTEGRADA (red vertical)		0 - 30 m
CLADÓCEROS: 9,28 %	COPÉPODOS: 21,02 %	ROTÍFEROS: 67,95 %

La composición detallada de la población zooplanctónica presente en la muestra cuantitativa de zooplancton indicando la densidad y biomasa, y el porcentaje de las especies presentes en la muestra integrada de la red vertical, se muestran en la tabla 5:

Tabla 5. Composición detallada de la comunidad de zooplancton.

CÓDIGO	COMPOSICIÓN	ABUNDANCIA	BIOMASA	PORCENTAJE
TAXÓN	ZOOPLANCTON	Ind./L	mg/L	%
	CLADÓCEROS			
BOSMLONG0	<i>Bosmina longirostris</i>	0,19	0,25	1,05
CERIPULC0	<i>Ceriodaphnia pulchella</i>	7,69	9,23	0,18
DIAPMONG0	<i>Diaphanosoma mongolianum</i>	55,38	138,46	8,06
	COPÉPODOS			
ACANAMER0	<i>Acanthocyclops americanus</i>	2,69	10,24	3,15
NEOLALLU0	<i>Neolovenula alluaudi</i>	20,58	21,52	5,60
THERDYBO0	<i>Thermocyclops dybowskii</i>	0,38	1,04	2,80
CYCLOPFAM	Ciclópido	50,77	13,85	9,46
	ROTÍFEROS			
ASCOOVAL0	<i>Ascomorpha ovalis</i>	3,08	0,19	0,18
ASPLPRIO0	<i>Asplanchna priodonta</i>	13,85	10,38	4,90
COLLPELA0	<i>Collotheca pelagica</i>	29,23	0,88	2,80
HEXAFENNO0	<i>Hexarthra fennica</i>	32,31	6,72	0,70
HEXAOXYU0	<i>Hexarthra oxyuris</i>	4,62	0,96	15,41
KERACCOCH0	<i>Keratella cochlearis</i>	183,08	9,15	28,02
KERCOTEC1	<i>Keratella cochlearis tecta</i>	4,62	0,23	0,18
POLYDOLI0	<i>Polyarthra dolichoptera</i>	70,77	3,61	11,91
POLYMAJO0	<i>Polyarthra major</i>	36,92	4,80	3,50
SYNCPECT0	<i>Synchaeta pectinata</i>	1,54	0,51	0,18
TRICPUSI0	<i>Trichocerca pusilla</i>	1,54	0,04	0,18
	OTROS			
DREIPOLY0	<i>Dreissena polymorpha</i> (Mejillón cebra)	15,38	6,46	1,75
	Total Cladóceros	63,27	147,94	9,28
	Total Copépodos	74,42	46,65	21,02
	Total Rotíferos	381,54	37,48	67,95
	Total Otros	15,38	6,46	1,75
	Total	534,62	238,53	100

5. DIAGNÓSTICO DEL GRADO TRÓFICO

Se han considerado los indicadores especificados en la tabla 6, estableciéndose el estado trófico global del embalse según la metodología descrita en la sección 5 de la MEMORIA DEL ESTUDIO.

Tabla 6. Parámetros indicadores y rangos de estado trófico.

Parámetros Estado Trófico	Ultraoligotrófico	Oligotrófico	Mesotrófico	Eutrófico	Hipereutrófico
Concentración P ($\mu\text{g P/L}$)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
Disco de Secchi (m)	>6	6-3	3-1,5	1,5-0,7	<0,7
Clorofila a ($\mu\text{g/L}$) epilimnion	0-1	1-2,5	2,5-8	8,0-25	>25
Densidad algal (cel./ml)	<100	100-1000	1000-10000	10000-100000	>100000
VALOR PROMEDIO FINAL	> 4,2	3,4 – 4,2	2,6 – 3,4	1,8 – 2,6	< 1,8

En la tabla 7 se incluye el estado trófico indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según la valoración de este estado trófico final.

Tabla 7. Diagnóstico del estado trófico del embalse de Caspe.

INDICADOR	VALOR	ESTADO TRÓFICO
P TOTAL	9,25	Oligotrófico
CLOROFILA a	3,31	Mesotrófico
DISCO SECCHI	5,00	Oligotrófico
DENSIDAD ALGAL	10015	Eutrófico
ESTADO TRÓFICO FINAL	3,25	MESOTRÓFICO

Atendiendo a los criterios seleccionados, la concentración de clorofila a sitúa al embalse en rangos de mesotrofia. Mientras que el fósforo total (PT) y la transparencia (DS) indican un estado de oligotrofia. La densidad algal, establece un estado eutrófico para el embalse. Combinando todos los indicadores el estado trófico final para el embalse de CASPE ha resultado ser **MESOTRÓFICO**.

6. DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL ECOLÓGICO

a) Aproximación experimental (*PEexp*)

Se han considerado los indicadores especificados en la tabla 8, estableciéndose el potencial ecológico del embalse según la metodología descrita en la sección 6.3 de la MEMORIA DEL ESTUDIO.

Tabla 8. Parámetros y rangos para la determinación del potencial ecológico experimental.

Indicador	Elementos	Parámetros	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo	
Biológico	Fitoplancton	Densidad algal (cel/ml)	< 10 ³	10 ³ -10 ⁴	10 ⁴ -10 ⁵	>10 ⁵	
		Biomasa algal, Clorofila <i>a</i> (µg/L)	< 2,5	2,5-8	8,0-25	>25	
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	< 0,5	0,5-2	2-8	>8	
		<i>Phytoplankton Assemblage Index (Q)</i>	> 3	2-3	1-2	<1	
		<i>Trophic Index (TI)</i>	< 2,79	2,79-3,52	3,52-4,25	>4,25	
		<i>Phytoplankton Trophic Index (PTI)</i>	> 3,4	2,6-3,4	1,8-2,6	<1,8	
	<i>Phytoplankton Reservoir Trophic Index (PRTI)</i>	< 6,6	6,6-9,4	9,4-12,2	>12,2		
Zooplancton	<i>Zooplankton Reservoir Trophic Index (ZRTI)</i>	< 6,6	6,6-9,4	9,4-12,2	>12,2		
INDICADOR BIOLÓGICO (1)			>3,4	2,6 - 3,4	1,8 - 2,6	< 1,8	
Indicador	Elementos	Parámetros	Muy bueno	Bueno	Moderado	Deficiente	Malo
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	>6	3-6	1, 5 -3	0, 7 -1,5	<0, 7
	Oxigenación	Concentración O ₂ (mg O ₂ /L)	>8	8-6	6-4	4-2	<2
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P/L)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
INDICADOR FISICOQUÍMICO (2)			Muy bueno	Bueno	Moderado		
			>4,2	3,4-4,2	<3,4		

(1) La valoración del indicador biológico se obtiene asignando la calificación del elemento de menor puntuación (fitoplancton o zooplancton) o peor calidad, según la metodología *one out, all out*.

(2) La valoración del indicador fisicoquímico se obtiene asignando la calificación del elemento de menor puntuación o peor calidad, según la metodología *one out, all out*.

La combinación de los dos indicadores, fisicoquímico y biológico, para la obtención del potencial ecológico experimental final sigue el esquema de decisiones indicado en la tabla 9:

Tabla 9. Combinación de los indicadores.

Indicador Biológico	Indicador Fisicoquímico	Potencial Ecológico Experimental
Bueno o superior	Muy bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Moderado	Moderado
Moderado	Indistinto	Moderado
Deficiente	Indistinto	Deficiente
Malo	Indistinto	Malo

En la tabla 10 se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros e indicadores, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico final.

Tabla 10. Diagnóstico del potencial ecológico del embalse de Caspe.

Indicador	Elementos	Parámetros	Valor	Potencial
Biológico	Fitoplancton	Densidad algal (cel/ml)	10015	Deficiente
		Clorofila a (µg/L)	3,31	Moderado
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	0,97	Moderado
		<i>Phytoplankton Assemblage Index (Q)</i>	2,37	Moderado
		<i>Phytoplankton Trophic Index (PTI)</i>	3,09	Moderado
		<i>Trophic Index (TI)</i>	2,87	Moderado
		<i>Phytoplankton Reservoir Trophic Index (PRTI)</i>	2,52	Bueno o superior
	Zooplancton	<i>Zooplankton Reservoir Trophic Index (ZRTI)</i>	8,58	Moderado
INDICADOR BIOLÓGICO			3	MODERADO
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	5,00	Bueno
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg O ₂ /L)	0,41	Malo
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P/L)	9,25	Bueno
INDICADOR FISICOQUÍMICO			1	MODERADO
POTENCIAL ECOLÓGICO				MODERADO

b) Aproximación normativa (PENorm)

Se han considerado los indicadores, los valores de referencia y los límites de clase B⁺/M (Bueno o superior/Moderado), M/D (Moderado/Deficiente) y D/M (Deficiente/Malo), así como sus ratios de calidad ecológica (RCE), especificados en las tablas 11 y 12, estableciéndose el potencial ecológico del embalse según la metodología descrita en la sección 6.3, apartado b) de la MEMORIA DEL ESTUDIO.

Tabla 11. Valores de referencia propios del tipo (VR_t) y límites de cambio de clase de potencial ecológico de los indicadores de los elementos de calidad de embalses (RD 817/2015).

Tipo	Elemento	Parámetro	Indicador	VR _t	B ⁺ /M (RCE)	M/D (RCE)	D/M (RCE)
Tipo 1	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,00	0,211	0,14	0,07
			Biovolumen mm ³ /L	0,36	0,189	0,126	0,063
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,10	0,974	0,649	0,325
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,908	0,607	0,303
Tipo 7	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm ³ /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 9	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm ³ /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 10	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm ³ /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 11	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,60	0,433	0,287	0,143
			Biovolumen mm ³ /L	0,76	0,362	0,24	0,12
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	0,61	0,982	0,655	0,327
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,715	0,48	0,24
Tipo 12	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,40	0,195	0,13	0,065
			Biovolumen mm ³ /L	0,63	0,175	0,117	0,058
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	1,50	0,929	0,619	0,31
			Porcentaje de cianobacterias	0,10	0,686	0,457	0,229
Tipo 13	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila a mg/m ³	2,10	0,304	0,203	0,101
			Biovolumen mm ³ /L	0,43	0,261	0,174	0,087
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	1,10	0,979	0,653	0,326
			Porcentaje de cianobacterias	0,00	0,931	0,621	0,31

Tabla 12. Parámetros, rangos del RCE y valores para la determinación del potencial ecológico normativo.

			RANGOS DEL RCE				
Indicador	Elementos	Parámetros	Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo	
Biológico	Fitoplancton	Clorofila a (µg/L)	≥ 0,195	0,194 – 0,13	0,12 – 0,065	< 0,065	
		Biovolumen algal (mm ³ /L)	≥ 0,175	0,174 – 0,117	0,116 – 0,058	< 0,058	
		Índice de Catalán (IGA)	≥ 0,929	0,928 – 0,619	0,618 – 0,31	< 0,31	
		Porcentaje de cianobacterias	≥ 0,686	0,685 – 0,457	0,456 – 0,229	< 0,229	
			Bueno o superior	Moderado	Deficiente	Malo	
INDICADOR BIOLÓGICO			>0,6	0,4-0,6	0,2-0,4	< 0,2	
			RANGOS DE VALORES				
Indicador	Elementos	Parámetros	Muy bueno	Bueno	Moderado	Deficiente	Malo
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	>6	3-6	1, 5 -3	0, 7 -1,5	<0, 7
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg O ₂ /L)	>8	8-6	6-4	4-2	<2
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P/L)	0-4	4-10	10-35	35-100	>100
			Muy bueno	Bueno	Moderado		
INDICADOR FISICOQUÍMICO			>4,2	3,4-4,2	<3,4		

La combinación de los dos indicadores, fisicoquímico y biológico, para la obtención del potencial ecológico normativo final sigue el esquema de decisiones indicado en la tabla 13.

Tabla 13. Combinación de los indicadores.

Indicador Biológico	Indicador Fisicoquímico	Potencial Ecológico Experimental
Bueno o superior	Muy bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Bueno	Bueno o superior
Bueno o superior	Moderado	Moderado
Moderado	Indistinto	Moderado
Deficiente	Indistinto	Deficiente
Malo	Indistinto	Malo

En la tabla 14 se incluye el potencial indicado por cada uno de los parámetros, así como la catalogación de la masa de agua según el potencial ecológico final (*PE_{norm}*) tras pasar el filtro del indicador fisicoquímico.

Tabla 14. Diagnóstico del potencial ecológico (*PE_{norm}*) del embalse de Caspe.

Indicador	Elementos	Parámetro	Indicador	Valor	RCE	RCET	<i>PE_{norm}</i>
Biológico	Fitoplancton	Biomasa	Clorofila <i>a</i> (µg/L)	3,31	0,73	0,86	Bueno o superior
			Biovolumen algal (mm ³ /L)	0,97	0,65	0,83	Bueno o superior
			Media			0,85	
		Composición	Índice de Catalán (IGA)	3,04	0,996	0,98	Bueno o superior
			Porcentaje de cianobacterias	21,13	0,79	0,73	Bueno o superior
			Media			0,86	
Media global						0,85	
INDICADOR BIOLÓGICO				0,85		BUENO O SUPERIOR	
Indicador	Elementos	Indicador	Valor			<i>PE_{norm}</i>	
Fisicoquímico	Transparencia	Disco de Secchi (m)	5,00			Bueno	
	Oxigenación	O ₂ hipolimnética (mg O ₂ /L)	0,41			Malo	
	Nutrientes	Concentración de PT (µg P/L)	9,25			Bueno	
INDICADOR FISICOQUÍMICO				1		MODERADO	
POTENCIAL ECOLÓGICO <i>PE_{norm}</i>				MODERADO			



ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Figura 7. Vista de la presa del embalse



Figura 8. Vista del punto de acceso